



معرفی مقدماتی برخی از هیبریدهای خودروی بادام در استان کرمان و خصوصیات آنها

- سید محمد رضا مظفری، عضو هیأت علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
- علی ایمانی، عضو هیأت علمی بخش تحقیقات باطنی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

تاریخ دریافت: آذر ماه ۱۳۸۳ | تاریخ پذیرش: مرداد ماه ۱۳۸۴

Email: imani_a45@yahoo.com

چکیده

بادام یکی از مهمترین محصولات خشکبار در ایران می‌باشد و ایران با تولید ۱۲۰۰۰ تن و سطح کشت بیش از ۱۱۵۰۰ هکتار و چهارمین کشور تولیدکننده دنیا است. استان کرمان یکی از مهمترین نواحی پرورش بادام در کشور بوده و دارای سطح کشت ۱۲۰۰۰ هکتار بادام (*Amygdalus communis*) و حدود ۵۰۰۰۰ هکتار جنگل خودرو از سایر گونه‌های بادام می‌باشد. به دلیل تکثیر از طریق بذر، تنوع بین گونه‌ای و ژنتیکی بادام با صفات بیولوژیکی و پومولوژیکی متفاوت، در سطح پهناور استان کرمان وجود دارد. به منظور شناسایی، جمع آوری و ارزیابی ژنتیک‌ها و گونه‌های بادام در قسمت مرکزی ایران (استان کرمان) این پژوهش از سال ۷۹ انجام گرفته است. در این بررسی ژرم پلاسم مناطق عمده پرورش بادام در شهرستان‌های سیرجان و شهریارک مطالعه شدند. مشخصات ژنتیک‌ها و گونه‌های بادام انتخابی که دارای صفات ویژه‌ای همچون دیرگل دهی، عملکرد خوب داشته براساس دیسکریپتور بادام (۸) یادداشت برداری و از میان آنها سه هیبرید طبیعی بین گونه‌ای *Amygdalus communis × A. elaeagnifolia*; *A. communis × A. scoparia* and *A. communis × Prunus persica* شناسایی شدند. این هیبریدها با داشتن صفاتی نظری قدرت رشد زیاد، مقاومت به تنش‌ها و شانکر می‌توانند به عنوان پایه برای درختان میوه به حساب آیند. در این مقاله برخی از صفات و خصوصیات آنها توضیح داده می‌شود.

کلمات کلیدی: بادام (*A. communis*), هیبریدهای طبیعی بادام، پایه بادام

Pajouhesh & Sazandegi No:67 pp: 2-8

Preliminary introducing some of natural hybrids of almond in Kerman province and their traits

By: M.R. Mozaffari, Seed and Plant Improvement Dept., Kerman Agricultural Research Center, Kerman, Iran, and A. Imani, Horticulture Dept., Seed and Plant Improvement Research Institute, Karaj, Iran.

Almond is one of the most important nut fruit in Iran, with a production of 120000 tonnes and a cultivation area of over 115000 hectares, Thus Iran is ranked 4th among almond producing countries . Kerman province is one of the most important regions of almond growing in Iran, with cultivation area 12000 hectares of almond (*A. communis*) orchards

and 500000 hectares of other almond species. Traditionally almond is propagated by sowing seed and there is a wide range of genotypes of almond with different morphological and biological characteristics. Since 2000 a research program for selecting superior almond genotypes and wild species in the central part of Iran (Kerman province) has been carried out. In this program, almond germplasm of Sirjan and Shahrebabak area were evaluated. Characteristics of selections according to Golcans' almond descriptor (1985) were recorded. Superior seedlings with special characters such as late blooming, high yield, vigorous growth, water stress tolerance and canker resistance were selected. In this research project, we identified 3 interesting natural hybrids distinguished as: *A. communis* × *Prunus persica*, *A. communis* × *A. elaeagnifolia*, *A. communis* × *A. scoparia*. These hybrids found to have very important characteristics such as vigorous growth, water stress tolerance and canker resistance. It seems that they are desirable rootstocks for commercial almond cultivars. In this paper these 3 natural hybrids are described.

Key words: Almond (*Amygdalus communis*), Natural almond hybrids, Almond rootstock, Selection,

مقدمه

از اهمیت زیادی برخوردار هستند و می‌توانند به عنوان پایه در تحقیقات و مطالعات بعدی مدنظر قرار گیرند. در حال حاضر ۱۲۰۰۰ هکتار بادام *A. communis* و حدود ۵۰۰ هزار هکتار جنگل از سایر گونه‌های بادام در استان کرمان وجود دارد.

امروزه از پتانسیل موجود در پایه‌ها، به ویژه در شرایط نامطلوب محیطی و تشکیلاتی زیستی و غیر زیستی استفاده فراوان می‌کنند. همچنین با توجه به تاثیر پایه بر خصوصیات پیوندک می‌توان از این خاصیت نیز در بهبود کیفی و سودآوری باغ استفاده نمود. این نوع تاثیرات ناشی از اثر متقابل بین ژنتیک پایه و پیوندک می‌باشد. در حال حاضر پایه‌های کلونی برای احداث باغات جدید و متراکم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. در این میان پایه‌هایی که به سهولت از دیگر رویشی پیدا می‌کنند در برنامه‌های اصلاحی بیشتر مورد توجه می‌باشند^(۷). ایستگاه تحقیقات NRA در بوردو فرانسه نخستین ایستگاه آزمایش کننده زرم پلاسم گونه‌ها به عنوان پایه بوده و هدف برنامه‌های آنها یافتن پایه‌های سازگار به شرایط نامطلوب خاکی، مقاومت به سرما، سازگاری پیوند و سهولت تکثیر رویشی بوده است. پایه‌هایی که از طریق دورگیری و سلکسیون در قالب پروژه‌های تحقیقاتی موجود آمده‌اند، منابع ژنتیکی با ارزش می‌باشند، که ازان جمله می‌توان به ژنتیک‌های انتخابی میروبالان مقاوم به نماتد در خاک‌های غرقابی، هیبریدهای انتخابی حاصل از تلاقی بادام قرفی (Garfi)، هلوی نمارد مقاوم به نماتد و خشکی و کلroz و برخی ژنتیک‌های بادام از جمله سری‌های Alnem مقاوم به نماتد و خشکی و کلroz (۱۰، ۱۴) اشاره نمود در حال حاضر استفاده از پایه‌های هیبرید بین گونه‌های در برخی کشورها خیلی متداول شده است به عنوان مثال پایه‌های مورد استفاده برای هلو در تونس ۹۰ درصد، ایتالیا ۶۰ الی ۷۰ درصد، اسپانیا ۵۰ الی ۶۰ درصد و یونان ۱۵ الی ۲۵ درصد هیبرید هلو و بادام می‌باشد^(۹).

در کشورهای مختلف از پایه‌های مختلف مختلاف با توجه به شرایط میوه‌کاری استفاده می‌شود به عنوان مثال برای تولید هلو در آمریکا از پایه بیلی (Bailey)، در مکزیک از پایه کریولو (Criollo)، در شیلی از نماگارد (Golden Queen) و در نیوزیلند و استرالیا از پایه گلدن کوئین (Nemgard)

میوه‌های هسته‌دار (Prunus) به تیره Rosaceae و زیر تیره Prunoidae تعلق دارند در این زیر تیره سه بخش (Section) تحت عنوانی Cerasus و Prunophora، Amygdalus و گوجه و همچنین زردالوها در بخش Prunophora دسته بندی می‌شوند و آبلو و گیلاس در بخش Cerasus و بادام و هلو در بخش Amygdalus قرار دارند. از دیدگاه گیاه شناسی قرابت هلو و بادام زیاد بوده و لذا از سازگاری پیوند و همچنین سازگاری گرده‌افشانی برخوردار می‌باشند بهطوری که امروزه وجود هیبریدهای طبیعی هلو و بادام در طبیعت (مثل GF677) مؤید این مطلب است. از طرفی بادام دارای گونه‌های طبیعی است و در اثر تلاقی بین آنها هیبریدهای بین گونه‌ای فراوان بوجود آمده است که در اغلب مناطق بادام خیز دنیا بهوضوح دیده می‌شود. در کشورهای حوزه دریای مدیترانه بهویژه در فرانسه از این پتانسیل در بهزادی پایه‌های درختان هلو و بادام استفاده فراوان می‌کنند و در این راستا برای دستیابی به پایه‌های هلو و بادام علاوه بر سلکسیون (گرینش هیبریدهای بین گونه‌ای طبیعی)، از طریق برنامه‌های تلاقی نیز این موضوع را بهطور جدی پی‌گیری می‌کنند. خوشبختانه به دلیل بومی بودن هلو و بادام در کشور ما، گونه‌های وحشی و هیبریدهای بین گونه‌ای بادام به تعداد زیادی یافت می‌شود بهطوری که طبق مطالعات دکتر ثابتی^(۲) چندین گونه بادام تحت عنوانی *A. arabica* و *A. erioclada* گزارش شده است که می‌توانند در برنامه‌های بهزادی مورد استفاده قرار گیرند. در میان مناطق بادام خیز کشور می‌توان به استان کرمان اشاره نمود که این استان با مساحت ۱۷/۵ میلیون هکتار بین ۲۵ درجه و ۵۵ دقیقه تا ۳۲ درجه عرض شمالی و ۵۳ درجه و ۲۶ دقیقه تا ۵۹ درجه و ۲۹ دقیقه طول شرقی قرار گرفته است. در این استان ۷/۷ میلیون هکتار مرتع، ۱/۵ میلیون هکتار جنگل و ۶/۳ میلیون هکتار عرصه بیابان و

فاقد پوشش گیاهی وجود دارد. این استان از بیشترین تنوع گونه‌های بادام و هیبریدهای بین گونه‌ای برخوردار می‌باشد. این نوع تنوع بین گونه‌ای در سطح پهناور استان امکان به وجود آمدن هیبریدهای طبیعی بادام را فراهم نموده است و این هیبریدها

گونه‌ای شناسایی شده که خصوصیات مورفولوژیکی و پومولوژیکی آنها مطالعه و در این مقاله ارائه گردیده است.

مواد و روش‌ها

به منظور شناسایی، جمع‌آوری و ارزیابی ژنتیپ‌های محلی و گونه‌های بادام در استان کرمان این پژوهش از سال ۷۹ تا ۸۳ انجام گرفته است. در این بررسی، گونه‌ها و ژنتیپ‌های مناطق عمدۀ پرورش بادام در شهرستان سیرجان و شهربایک مطالعه شدند.

برای انجام این تحقیق از اواخر اسفندماه هر سال بازدید از باغات بذری شروع و تک درختانی که نسبت به توده برتر بودند و ظاهراً سالم و قوی به نظر می‌رسیدند انتخاب و با رنگ علامت‌گذاری شده و آدرس باغ دقیقاً ثبت و کروکی درخت یا درختان مورد نظر در باغ ترسیم شدند. ژنتیپ‌های انتخاب شده کدگذاری گردیده و صفات مورد نظر هر تک درخت در هر مرحله فنولوژیکی اندازه‌گیری و ثبت شدند و تک درختان بذری بادام که دارای صفات ویژه‌ای همچون دیرگلی، عملکرد زیاد داشتند انتخاب و با توجه به دیسکریپتور بادام (۸) صفات زیر یادداشت‌برداری شدند.

(الف) خصوصیات درخت: موقعیت جوانه‌های گل (عادت گلدهی و باردهی)، شکل درخت، اندازه درخت، تراکم شاخه و برگ، سلامت درخت (ب) خصوصیات گل: تاریخ باز شدن گلهای طول دوره گلدهی، ریزش جوانه گل، رنگ گلبرگها و کاسبرگها


(ج) خصوصیات برگ: شکل برگ، طول و عرض برگ

(د) خصوصیات میوه: زمان رسیدن، ضخامت پوست سبز، ابعاد میوه، رنگ مغز، میزان محصول، چروکیدگی مغز ژنتیپ‌ها در ژرم پلاسم براساس خصوصیات فوق الذکر (دوره گلدهی، تراکم گل، قدرت رشد درخت، دوره رسیدن میوه، میزان محصول، وزن میوه، کیفیت میوه و مقاومت به سرما و بیماری‌ها) امتیاز بندی شدند.

استفاده می‌شود. متداول‌ترین پایه در فرانسه (GF677) بوده در حالی که در کانادا هیبرید هلو و *P. davidiana* می‌باشد و اخیراً این پایه در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و یونان نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر تعداد پایه‌های جدیدی با دامنه وسیعی از قدرت رشد معرفی شده‌اند (۸)

که از نظر قدرت رشد، به شرح جدول ۱ می‌باشند:

طبق گزارش Stada و Fideghelli (۷) تعداد کشورهای فعل در امر به نزدی ارقام جدید هلو و شلیل ۲۵ کشور، در بهنژادی پایه ۱۷ کشور و سیستم‌های کشت متراکم ۱۲ کشور، مدیریت تلفیقی آفات و تولید محصول ۹ کشور، کنترل آفات ۷ کشور، فیزیولوژی پس از برداشت ۷ کشور، کیفیت میوه ۶ کشور، تنک میوه ۶ کشور، آبیاری ۵ کشور، عملیات باگبانی ۴ کشور، کوتاهی عمر درختان و مسائل مربوط به جایگزینی ۴ کشور می‌باشد. در این گزارش مشخص می‌گردد که دو مبنی موضوع عده پس از اصلاح رقم، اصلاح پایه می‌باشد که در اغلب کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد. در اصلاح پایه‌ها نیز از مهمترین موضوعات می‌توان مقاومت به نمادها، تحمل به میزان کلسیم بالا، مقاومت به پوسیدگی طوفق، مقاومت به گال یقه، مقاومت به آرمیلاریا، کنترل اندازه درخت و از همه مهمتر سازگاری به شرایط آب و هوایی و متتحمل به تنفس‌های خاکی (شوری، گرما و غیره) نام برد (۷،۵،۳). متأسفانه در رابطه با پایه‌های درختان میوه بهویژه هلو و بادام در ایران کارهای اصلاحی چندان صورت نگرفته، هرچند که در مورد اصلاح ارقام میوه تحقیقات خوبی انجام گرفته است. در اصلاح درختان میوه، دورگ‌گیری، سلکسیون، موتاسیون و بیوتکنولوژی مهمترین روش‌ها می‌باشند (۱، ۱۱). در این میان هرچند روش دورگ‌گیری هدفمند، مهمترین روش دستیابی به ارقام و پایه‌های درختان میوه بوده ولی هنوز در حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد ارقام از طریق گرینش از طبیعت (توده‌های بذری) بدست می‌آید (۱۲،۷،۲) هدف از این پژوهش سلکسیون و دستیابی به هیبریدهای بین گونه‌ای بادام بوده است که در نتیجه ۳ هیبرید بین



شکل ۱- هیبرید ارجن × بادام و میوه آن



شکل ۲- هیبریدهلو × بادام و میوه آن

دیرگلی هیبرید هلو-بادام به خاطر نیاز سرمایی نسبتاً زیاد هلو می‌باشد. اندازه و رنگ گل در هیبریدها متفاوت بوده به طوری که رنگ گل در هیبرید هلو-بادام سفید کرم رنگ بوده که بیانگر به ارث بردن رنگ گل صورتی از هلو می‌باشد. سایر گزارش‌ها (۸،۱۱) نیز نشان می‌دهد اندازه، شکل و رنگ گلبرگ و تعداد پرچم‌ها متغیر بوده و همچنین رنگ و اندازه برگ‌ها نیز تا حدودی متفاوت باشند، گرچه وراثت پذیری تعداد پرچم در نتاج کم می‌باشد. اندازه و وزن میوه در هیبرید هلو-بادام نسبت به الک-بادام و ارچن بادام بزرگتر بوده به طوری که وزن میوه هلو-بادام، الک-بادام و ارچن-بادام بترتیب $\frac{۱}{۲}$ ، $\frac{۳}{۲}$ و $\frac{۱۰۶}{۱۰۶}$ گرم بوده است (تصاویر ۱ تا ۴) و وزن مغز نیز به ترتیب در هیبرید هلو-بادام، الک-بادام و ارچن-بادام $\frac{۰}{۵}$ ، $\frac{۰}{۳}$ و $\frac{۰}{۴}$ گرم بوده ولی ارچن-بادام از درصد مغز بیشتری برخوردار است و درصد دو قلوبی مغز در ژنتیپ‌ها صفر است. اندازه برگ در هیبریدها متفاوت بوده به طوری که در هیبرید هلو-بادام اندازه بزرگتر ولی در دو ژنتیپ دیگر اندازه برگ کوچک‌تر می‌باشد. در هیبرید الک-بادام برگ‌ها کوچک و کرکدار می‌باشند که می‌تواند به عنوان پایه مقاوم به خشکی مورد بهره‌برداری قرار گیرند چون بعضی از گونه‌های وحشی بادام جهت سازگاری با شرایط بی‌آبی محل از برگ‌های کوچک و کرکدار بهره‌مند می‌باشند (۱۲،۹) درختان هیبرید هلو-بادام نسبت به الک-بادام و ارچن-بادام دارای قامت کشیده و بزرگتر می‌باشند (تصویر ۴) و همچنین عادت باردهی در هیبریدهای بین گونه‌ای انتخابی، متفاوت می‌باشد به طوری که هیبرید هلو بادام دارای عادت باردهی مخلوط (میوه دهی روی شاخه‌های یکساله و اسپور) ارچن-بادام روی شاخه و اسپور و الک-بادام باردهی روی شاخه‌های یکساله می‌باشند. طبق گزارش‌ها، ارقام با عادت باردهی اسپور، دارای نیاز غذایی و آبی بالا

نتایج و بحث

در بازدیدهای سال‌های اولیه انجام پژوهش مشاهده گردید که تعداد زیادی از درختان نسبت به توده درختان بذری دیرگل تریا دارای تیپ رشد و فرم متفاوت از سایر ژنتیپ‌ها بودند و این نوع ژنتیپ‌ها در مراحل اولیه انتخاب و کبدگذاری شدند. با توجه به اهداف برنامه‌های اصلاحی، در این مطالعه صفات مهم و خصوصیات مورفولوژیکی ژنتیپ‌ها براساس دیسکریپتور موجود (۸) مطالعه و ثبت شدند. داده‌های بدست آمده به طور جداگانه برای هر ژنتیپ ثبت گردید و در نهایت علاوه بر ژنتیپ‌های دیرگل بادام سه ژنتیپ (هیبرید بین گونه‌ای) مشخص و شناسایی شدند که در این مقاله خصوصیات این هیبریدهای بین گونه‌ای ارائه می‌گردد (جداوی ۲ تا ۵). زمان گله‌ی هیبریدهای نسبت به سایر درختان منطقه، متوسط و دیرتری داشتند و هیبریدهای هلو-بادام و الک-بادام نسبت به هیبرید ارچن-بادام دیرگل تر بوده است. طبق گزارش Fidegelli و Stada (۷) احتمالاً

جدول شماره ۱: برخی از خصوصیات پایه‌های انتخابی در دنیا


پایه	منشا	قدرت رشد(درصد)
GF677	هیبرید هلو و بادام	۱۳۰
Cadaman	P. <i>davidiana</i> × هلو	۱۲۰
Penta	آلو انتخابی	۱۱۰
PSA۶	هلو انتخابی	۱۰۰
Montclar	هلو انتخابی	۱۰۰
Barrier-۱	P. <i>davidiana</i> × هلو	۱۰۰
Tetra	آلو انتخابی	۹۰
PSA۵	هلو انتخابی	۸۰
Julior	آلو انتخابی	۷۵
Sirio	هیبرید هلو و بادام	۶۰

جدول شماره ۲ : خصوصیات درخت هیبریدهای بین‌گونه‌ای

هیبرید بین‌گونه‌ای			صفات اندازه‌گیری شده
ارچن-بادام	الوک-بادام	هلو-بادام	
۳۲	۹	۲۷	سن درخت (سال)
متوسط	زیاد	متوسط	مقاومت به کماپی
۱۵	۳۰	۱۸	دور آبیاری (روز)
۴-۳	۵-۴	۸-۶	رشد سالیانه (سانتی متر)
متتمایل به سفید	سبز تیره	قهوه‌ای روشن	رنگ شاخدها
شاخه یک ساله + اسپیور	شاخه یک ساله	شاخه یک ساله + اسپیور	محل قرار گرفتن جوانه گل
۳-۲	۴-۳	۳-۲	دو یا چندگل بودن جوانه‌ها
کم	کم	زیاد	تناب باردهی
زیاد	زیاد	زیاد	فراوانی میوه روی درخت
کم	متوسط	زیاد	مقدار محصول
میان رس	زوررس	دیررس	زمان رسیدن محصول
زیاد	زیاد	زیاد	مقاومت به سرمای زمستانه
هیچگونه علائمی مشاهده نشد	هیچگونه علائمی مشاهده نشد	هیچگونه علائمی مشاهده نشد	علایم بصری به شانکر

جدول شماره ۳ : خصوصیات گل هیبریدهای بین‌گونه‌ای

هیبرید بین‌گونه‌ای			صفات اندازه‌گیری شده
ارچن-بادام	الوک-بادام	هلو-بادام	
متوسط گل	دیرگل	دیرگل	زمان گلدهی
۵	۵	۵	تعداد کاسبرگ
قهوه‌ای روشن	ارغوانی	سبز	رنگ کاسبرگ
نیزه‌ای	نیزه‌ای	نیزه‌ای پهن	شکل کاسبرگ
۵	۵	۵	تعداد گلبرگ
سفید	سفید	سفید کرم	رنگ گلبرگ
قلبی شکل	قلبی شکافدار	قلبی شکل	شکل گلبرگ
۲۸	۲۵	۲۲	تعداد پرچم (متوسط)
فرمز کمرنگ	فرمز	سفید	رنگ پرچم



شکل ۳- هیبریدالوک × بادام و میوه آن

بوده است و در صورتی که بذور آزاد گرده افشاران هیبرید هلو- بادام تولید نهال های غیریکنواخت می کنند که شاید ناشی از هتروزیس باشد(۱۱،۹) گونه های مختلف بادام و هیبریدهای بین گونه ای از لحاظ صفات یاد شده و خیلی از صفات دیگر با هم اختلاف دارند و به عبارتی از یک نوع تنوع (دامنه ای از اختلاف و تفاوت های موجود بین مجموعه ای از موجودات مشابه) برخوردار هستند و این تنوع باعث ایجاد تغییر تکامل و سازگاری گیاه با مناطق و شرایط مختلف شده است. امروزه دستیابی به ارقام و گونه ها با صفات مهمی همچون مقاومت به آفات و بیماری ها، تنشهای محیطی و غیره یکی از اهداف مهم اصلاحی می باشد و در هر برنامه اصلاحی، وجود این نوع مواد ژنتیکی از عوامل عمده موقوفیت می باشند. بر این اساس برای شناسایی ارقام و گونه ها و

می باشند. بنابراین به نظر می رسد هیبرید الوک- بادام نسبت به دو هیبرید بین گونه دیگر دارای مقاومت به خشکی زیادتری می باشد، گرچه برای قضاوت علمی نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه است. رشد سالیانه در هیبرید هلو- بادام در مقایسه با دو هیبرید دیگر بیشتر بوده است که در سایر منابع علمی (۹) نیز رشد قوی در نسل F1 (هلو- بادام) در مقایسه با سایر هیبریدهای بین گونه های *Prunus* گزارش شده است که شاید به خاطر خصوصیات ژنتیکی رقم باشد.

برخی خصوصیات دیگر این هیبریدها نیز تحت بررسی می باشند که از آن جمله می توان به میزان ریشه زایی از طریق قلمه و یکنواختی نهال های حاصل از کشت بذور اشاره نمود (اطلاعات منتشر نشده است) به طوری که بذور کشت شده ارجمن- بادام دارای یکنواختی نهال ها خوب

هیبرید بین گونه ای			صفات اندازه گیری شده
ارجن- بادام	الوک- بادام	هلو- بادام	
کشیده	کشیده	پهن	شكل برگ
تیز	تیز	تیز	نوك برگ
تیز	تیز	پهن	قاعده برگ
کنگره دار	کنگره دار	کنگره دار	حاشیه
۲/۴	۲	۱۰/۱	طول برگ (cm)
۰/۷	۰/۵	۳/۲	عرض برگ (cm)
۰/۹	۰/۵	۱/۲	طول دم برگ (cm)
سبز کمرنگ	سبز تیره	سبز	رنگ سطح روشن
سبز کمرنگ	سبز کمرنگ	سبز روشن	رنگ سطح زیرین
متناوب	متناوب	متناوب	طرز فرار گرفتن برگ روی شاخه

جدول شماره ۴ : خصوصیات برگ هیبریدهای بین گونه ای

جدول شماره ۵: خصوصیات میوه و مغز هیبریدهای بین گونه‌ای

هیبرید بین گونه‌ای			صفات اندازه‌گیری شده
ارجن-بادام	الوک-بادام	هلو-بادام	
۲/۲	۲/۶	۳	طول میوه (cm)
۱/۶	۱/۴	۱/۹	عرض میوه
۱	۱/۱	۱/۷	ضخامت پوست میوه
۱/۰۶	۱/۲	۳/۲	وزن میوه (g)
۰/۴	۰/۳	۰/۵	وزن هسته (g)
بیضی	تخم مرغی کشیده	بیضی	شكل میوه
قهوہ‌ای	قهوہ‌ای کمرنگ	قهوہ‌ای	رنگ پوست میوه
نقطه‌ای	شیاردار	شیاردار	نقش روی پوست
ندارد	دارد	دارد	شکاف در پوست چوبی

6- Felipe , A . J . and Socias I company , R . 1987; Alyes guara and moncayo almonds . Hortscience , 22:961-962 .

7-Fideghelli,C. and G.D. Stada.1998; The peach industry in the world: Present situation and trend. Acta Horticulturea465,1998.

8- Kester D . E , T . M . Gradzeil and C.Grasselly , 1991 ; Almond in genetic resources of temperate fruit and crops . Acta Hort . No 290.

9- Monastrà , F . 1994; Response of ferragnes and tuono almond cultivars to different environmental conditions in southern Italy . Acta Horticulturea 373 .

10- Spiegel , R and J . Kochba . 1981 ; Inheritance of nut and kernel traits in almond Horticulturea 373 .

11- Socias I company , R . 1992 ; Breeding self-fertile almonds . Plant Breeding Reviews 8:313-38 .

12- Viti , R. and Loreti , F . 1994 ; Research on the bioagronomic behaviour of 22 almond cultivars of various origins. Acta Horticulturae 373 .

نگهداری آنها در کلکسیون جهت استفاده در برنامه‌های به زراعی و به نزدی این پژوهش انجام گرفته و منتج به شناسایی این سه هیبرید بین گونه‌ای بازرس شده است.

منابع مورد استفاده

۱- ایمانی، ع. ۱۳۷۹؛ اصلاح بادام، نشر آموزش کشاورزی

۲- ثابتی، ع. ۱۳۷۳؛ درختان و درختچه‌های ایران. انتشارات دانشگاه یزد

۳- چاچی، سعید. ۱۳۶۵؛ ارقام بادام‌های دیرگل . انتشارات اداره ترویج کشاورزی استان آذربایجان شرقی

4-Denisov . V . P . 1988 ; Almond genetic resources in the U.S.S.R and their use in production and breeding . Acta Horticulture.224-299-306.

5- Duval , H. and Grasselly , C . 1994 ; Behaviour of some self- fertile almond selection in the south east of France . Acta Horticulturea 373.

